



- Difficulty breathing
- Fever (100.4°F/38°C or higher)
- Severe muscle or joint pain
- Very low blood pressure
- Dizziness/lightheadedness
- Chills/shaking chills
- Confusion
- Headache

SIGNS AND SYMPTOMS MAY INCLUDE:

Call your oncologist or go to the emergency room if these signs appear.
Kymriah may cause side effects that are severe or life-threatening.

Patient Information

PATIENT WALLET CARD

**Have This Card With You At All Times
Show It To Any Doctor That Sees You And When
You Go To The Hospital**

You should plan to stay within 2 hours of the location where you received your treatment for at least 4 weeks after getting Kymriah. Your healthcare provider will check to see if your treatment is working and help you with any side effects that occur.



- Dificultad para respirar
- Fiebre (100.4°F/38°C o superior)
- Escalofríos/escalofríos
- Mareos/vahídos
- Presión arterial muy baja
- Dolor muscular o articular grave
- Náuseas, vómitos y diarrea graves
- Confusión
- con temblores

LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS PUEDEN INCLUIR:

Llame a su oncólogo o acuda a la sala de emergencias si aparecen estos signos.
Kymriah puede causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales.

Información del paciente

TARJETA PARA BILLETERA DEL PACIENTE

**Tenga consigo esta tarjeta en todo momento
Muéstresela a cualquier médico que lo vea y cuando
vaya al hospital**

Debe hospedarse en un lugar que se encuentre a menos de 2 horas de donde recibió tratamiento durante, al menos, 4 semanas después de haber recibido Kymriah. Su proveedor de atención médica verificará si el tratamiento está funcionando y lo ayudará con cualquier efecto secundario que se produzca.

INFORMATION FOR THE HEALTHCARE PROVIDER

This patient has received Kymriah (CAR-T cell) therapy

Following Kymriah treatment, Cytokine Release Syndrome (CRS) can happen. It may include neurological toxicities.



Please contact his/her treating oncologist in the following situations:

- before giving steroids or cytotoxic medications
- if the patient has a serious infection
- before the patient undergoes an invasive procedure

fold

fold

Date received Kymriah: _____

Oncologist Name (for Kymriah therapy): _____

Phone Number: _____

Kymriah is a CD19-directed genetically modified autologous T Cell immunotherapy indicated for the treatment of patients up to 25 years of age with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) that is refractory or in second or later relapse and adult patients with relapsed or refractory (r/r) large B-cell lymphoma after two or more lines of systemic therapy including diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) not otherwise specified, high grade B-cell lymphoma and DLBCL arising from follicular lymphoma,* and adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) after two or more lines of systemic therapy. The r/r FL is approved under accelerated approval based on response rate and duration of response. Continued approval for this indication may be contingent upon verification and description of clinical benefits in confirmatory trial(s).

*Limitation of Use: KYMRIAH is not indicated for treatment of patients with primary central nervous system lymphoma



INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA

Este paciente ha recibido terapia con Kymriah (células T y CAR)

Luego del tratamiento con Kymriah, puede producirse el síndrome de liberación de citocinas (Cytokine Release Syndrome, CRS). Puede incluir toxicidades neurológicas.



Comuníquese con el oncólogo que lo trata en las siguientes situaciones:

- Antes de administrar esteroides o medicamentos citotóxicos.
- Si el paciente tiene una infección grave.
- Antes de que el paciente se someta a un procedimiento invasivo.

fold

fold

Fecha en la que recibió Kymriah: _____

Nombre del oncólogo (para la terapia con Kymriah): _____

Número de teléfono: _____

Kymriah es una inmunoterapia a base de células T autólogas modificadas genéticamente dirigida contra CD19, indicada para el tratamiento de pacientes de hasta 25 años con leucemia linfoblástica aguda (acute lymphoblastic leukemia, ALL) precursora de células B refractaria o que tuvo una segunda recidiva, o más, y de pacientes adultos con linfoma de células B grandes refractario o en recidiva (r/r) luego de dos o más líneas de terapia sistémica que incluye linfoma difuso de células B grandes (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) no especificado de otra forma y linfoma de células B de alto grado y DLBCL provocados por el linfoma folicular,* y pacientes adultos con linfoma folicular (follicular lymphoma, FL) refractario o en recidiva luego de dos o más líneas de terapia sistémica. El FL r/r está aprobado bajo aprobación acelerada con base en la tasa de respuesta y la duración de la misma. La continuación de la aprobación para esta indicación puede depender de la verificación y descripción de los beneficios clínicos en el o los ensayos de confirmación.

*Limitación de uso: KYMRIAH no está indicado para el tratamiento de pacientes con linfoma del sistema nervioso central primario.

